

Abort i speciallægepraksis

Før du beslutter dig.

Inden du bestemmer dig for abort, bør du læse Komiteen for Sundhedsoplysningers pjecer *Abort* og *Hvornår vil du have børn* (www.sundhedsoplysning.dk). Hvis du er i tvivl, kan du få hjælp til afklaring ved en støttesamtale hos din egen læge eller en anden praktiserende læge efter eget valg, hos Mødrehjælpen, i amternes familieafdelinger eller i foreningen Sex & Samfunds Præventions- og Rådgivningsklinik i København.

Abort kan foretages medicinsk eller kirurgisk. I speciallægepraksis kan medicinsk abort gennemføres frem til 7 uger + 6 dage efter sidste menstruations første dag, kirurgisk abort 9 fulde uger. De væsentligste forskelle kan du se i skemaet.

I vores klinik tilbyder vi kun medicinsk abort.

FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS	
FORDELE	
MEDICINSK ABORT	KIRURGISK ABORT
<ul style="list-style-type: none">• du er vågen og med i hele processen, fordi du ikke skal bedøves• behandling uden ventetid• du aborterer på <i>naturlig vis</i>	<ul style="list-style-type: none">• du er vågen og med i hele processen, fordi du får lokalbedøvelse• behandling med meget kort ventetid• det er næsten altid overstået med det samme• du bløder mindre og kortere
ULEMPER	
<ul style="list-style-type: none">• du aborterer hjemme• du skal tage smertestillende medicin for ve-agtige smerter• 5% skal efterfølgende gennem en kirurgisk abort• du bløder mere og længere• anvendes ikke ved graviditetslængde over 7 uger	<ul style="list-style-type: none">• større risiko for infektion. Kirurgiske komplikationer• 2% skal efterfølgende gennem endnu en kirurgisk abort

For detaljer se

Medicinsk abort – hvad skal der ske?